



INGREDIENTE ACTIVO

Glufosinate ammonium 200 g/L

Nombre Químico
Glufosinate ammonium: (2RS)-2-amino-4-(methylphosphinato)butyric acid

No. CAS
Glufosinate ammonium: 77182-82-2

FORMULACIÓN

Concentrado soluble, SL

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Azul
Olor: Característico
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

ANTORCH® es un herbicida de contacto no selectivo, con acción sistémica. Presenta translocación únicamente en las hojas, predominantemente en las de la base de la planta.

MECANISMO DE ACCIÓN

ANTORCH® es un inhibidor de la glutamina sintetasa, conduce a la acumulación de los iones amonio e inhibe la fotosíntesis.

RECOMENDACIONES DE USO

ANTORCH® es un herbicida post-emergente cuya aplicación es dirigida al follaje de las malezas. El volumen de agua depende de la infestación de malezas. **ANTORCH®** se mezcla fácilmente con el agua.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Llenar el tanque de mezcla o el aspersor con la mitad de la cantidad de agua necesaria. Luego agregue la dosis recomendada de herbicida, agite la mezcla y complete el volumen de mezcla total con el agua de enjuague del triple lavado del envase que contenía el herbicida.

Para aplicar **ANTORCH®** utilice un aspersor de espalda, es recomendable que verifique el estado del equipo a emplear y que se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento y debidamente calibrado. Use boquillas de abanico o plano.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS	PC (Período de Carencia)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO		
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Caminadora	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>	1.5 L/ha	No Aplica
	Siempreviva	<i>Commelina diffusa</i>		
	Flor amarilla	<i>Bidens pilosa</i>		
	Garrapatilla	<i>Peperomia pellucida</i>		
	Paja de pato	<i>Echinochloa colonum</i>		
	Helecho	<i>Pityrogramma calomelanos</i>		
	Pata de burro	<i>Eleusine indica</i>		
	Cortadera	<i>Cyperus luzulae</i>		
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Caminadora	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>	1.5 L/ha	
	Paja de patillo	<i>Echinochloa colona</i>		
	Paja de burro	<i>Eleusine indica</i>		
	Coquito	<i>Cyperus iria</i>		
	Batatilla	<i>Piper marginatum</i>		
Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Caminadora	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>	1.5 L/ha	
	Paja de patillo	<i>Echinochloa colona</i>		
	Paja de burro	<i>Eleusine indica</i>		
	Coquito	<i>Cyperus iria.</i>		
	Batatilla	<i>Piper marginatum</i>		
Palma Africana (<i>Elaeis guineensis</i>)	Paja de patillo	<i>Echinochloa colona</i>	1.5 L/ha	
	Bledo	<i>Amaranthus spinosus</i>		

DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación

Plátano (Musa paradisiaca)	Caminadora	<i>Rottboellia cochinchinensis</i>	1.5 L/ha	No Aplica
	Siempreviva	<i>Commelina diffusa</i>		
	Flor amarilla	<i>Bidens pilosa</i>		
	Garraapatilla	<i>Peperomia pellucida</i>		
	Paja de pato	<i>Echinochloa colonom</i>		
	Helecho	<i>Pityrogramma calomelanos</i>		
	Pata de burro	<i>Eleusine indica</i>		
	Cortadera	<i>Cyperus luzulae</i>		

Volumen de agua: Banano: 200 litros/ha. **Maíz:** 300 litros/ha. **Mango:** 400 litros/ha. **Palma africana:** 300 litros/ha. **Plátano:** 200 litros/ha.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con sustancias alcalinas. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el Titular del Registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

CATEGORÍA 4 “LIGERAMENTE PELIGROSO”



PRESENTACIONES

1 litro, 3.8 litros, 19 litros y 200 litros

REGISTRO

13-H3/NA

FORMULADO POR

Jiangsu United Agrochemical Co. Ltd., Interoc S.A., Sichuan Leshan Fuhua Tongda Agro-Chemical Technology Co. Ltd., Guangdong Keiwa Chemical Trading Center Co. Ltd., Nanjing Leading Chemical Co. Ltd., Nanjing Red Sun Co. Ltd., Sinochem Agro Co. Ltd., Hebei Veyong Bio-Chemical Co. Ltd.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

INTEROC S.A.
km 16.5 Vía Daule
Guayaquil-Ecuador

DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación