

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo en caso de Ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se Inhala. Causa irritación moderada a los ojos. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas; Cuidado, evite el contacto. POSIBLE TERATOGENICO.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Picoxystrobin: Estrobilurina; Cyproconazole: Triazoles.

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad. **En caso de contacto con la piel**, retirese la ropa y lávese con abundante agua y jabón durante 15 a 20 minutos. **En caso de contacto con los ojos**, lavarlos con abundante agua fresca y jabón durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. **En caso de ingestión**, llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia si es necesario. “NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL” a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica.

En caso de inconsciencia CONSULTAR CON UN MÉDICO.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe dirigirse al control de síntomas y la condición clínica del paciente. **SINTOMATOLOGÍA:** Puede causar irritación moderada a los ojos.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD: “Este producto puede ser mortal si se ingiere”. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. “ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”. “NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”. “NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

“En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda”.



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME al: ECU 911 o al CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLÓGICO CIATOX: 1800- VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas. LINEA GRATUITA.

Corteva Agriscience de Ecuador S.A. Tel. 02-250-8751 Ex t. 114

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión. Entregue al distribuidor para su disposición final o al centro de acopio del programa Campo Limpio.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: **Approach™ Power** es tóxico para peces y organismos acuáticos invertebrados. No aplique directamente al agua. Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. No aplicar cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Para la aplicación de **Approach™ Power** se debe establecer una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados al consumo humano. En caso de derrame, recoja y deseché acorde con la autoridad local competente.

Approach™ Power

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Picoxystrobin 90 g/l
Cyproconazole 40 g/l
Aditivos.....c.s.p.1 l

Registro N°: 320-F1/NA

Titular del Registro: Corteva Agriscience de Ecuador S.A.

Av. 6 de diciembre 2816 y Paúl Rivet. Edificio Josueth Gonzáles. Oficina 10.
Quito, Ecuador



FORMULADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

Rizobacter Argentina S.A.

Av. Dr. Arturo Frondizi, 1150 - Parque Industrial,
Pergamino. Buenos Aires. B2702HDA. Argentina.

Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.
Manmonal, Km 14, Cartagena Apartado
2888 Colombia

CTVA Proteção de Cultivos Ltda
Rod. Presidente Tancreado de Almeida Neves,
Km 38. Franco de Rocha-SP, 07809-105 Brazil

Corteva Agriscience Argetina S.R.L.
Avda. Hipólito Irigoyen N° 2900- (S2202DRA)
Pto Gral San Martín
Provincia de Santa Fe

LOTE N°:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

GRUPO

11

3

FUNGICIDA

CONTENIDO NETO: 1 Litro

™ @ Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva.

Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala.

Muy tóxico Para
organismos
Acuáticos



PELIGRO

---Internal Use---

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Approach™ Power es un fungicida de amplio espectro para el control foliar de enfermedades. Tiene actividad sistémica, traslaminar y protectora de larga duración. **Approach™ Power** se debe aplicar dentro de un programa de protección de cultivos en rotación con otros fungicidas. **Approach™ Power** a través de sus activos Picoxystrobin y Cyproconazole, actúa como inhibidor de la quirona interna, interviniendo en proceso de germinación de esporas y pérdida de integridad de la pared celular del hongo a controlar. penetra rápidamente en la planta, reduciendo pérdidas de lavado por lluvias a partir de una hora después de realizada la aplicación.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Picoxystrobin, Acción preventiva y curativa. Inhibidor de la respiración (fungicida QoL). **Cyproconazol**, Sistémico con acción protectora, curativa y erradicante. Interrumpe la función de la membrana. Un inhibidor de la biosíntesis de ergosterol.

El uso de este producto se debe apoyar en las estrategias de manejo de resistencia, tales como prácticas culturales y biológicas de control y la rotación de grupos de fungicidas con diferentes modos de acción en las aplicaciones, enfocadas en el estado más susceptible de la plaga.

MODO DE EMPLEO: Disolver completamente la cantidad de **Approach™ Power** a ser usada en un balde, luego depositarla en el tanque de mezcla que contenga agua hasta ¾ o la mitad de su capacidad. Completar el volumen total de agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

EQUIPOS DE APLICACIÓN: Aspersión foliar, asegurando cobertura del área total foliar del cultivo.

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga	Dosis (l/ha)	Periodo de Carencia
Maíz (Zea mays)	Mancha de asfalto (Phyllachora maydis)	1.0	30
Arroz (Oriza sativa)	Mancha naranja Gaeumennomyces sp	0.8	42

PC: Periodo de carencia Días en que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

VOLUMEN DE AGUA: **Maíz** se recomienda utilizar 400 l/ha. **Arroz** se recomienda utilizar 300 l/ha

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN: **Maíz:** realizar la aplicación en un estado de desarrollo V6-V8 con inicios de síntomas de mancha de asfalto.

Arroz: realizar una aplicación en crecimiento vegetativo a partir de los 30 días después de la siembra.

Manejo de resistencia: **Approach™ Power** contiene el ingrediente activo Picoxystrobin (CÓDIGO FRAC 11) y Cyproconazol (CÓDIGO FRAC 3). No se recomienda usar únicamente **Approach™ Power** u otros fungicidas de los CÓDIGOS 11 y 3 para controlar la misma enfermedad durante toda la temporada. Se recomienda rotar y/o mezclar con productos que tengan diferentes mecanismos de acción (MoA) o limitar el número total de aplicaciones por temporada. No modifique la dosis recomendada en etiqueta, ni lo use fuera del momento recomendado. Se alienta el manejo responsable de la resistencia para garantizar un control efectivo a largo plazo de las enfermedades fúngicas. **Approach™ Power** no debe alternarse o ser mezclado con cualquier fungicida al que ya se haya desarrollado resistencia.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: No se recomienda su uso en mezcla con otros productos agroquímicos

FITOTOXICIDAD: Si se utiliza este producto siguiendo las recomendaciones de dosis y manejo que se incluyen en esta etiqueta, no se espera efectos adversos o fitotóxicos.

RESPONSABILIDAD: “El titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORÍA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO



CONTROL REGULATORY		
Fecha de actualización	Concepto	Detalle
2023-12-04	Nuevo registro	-Se crea la HIA para el nuevo registro Aproach Power
2024-02-26	Ampliación uso	-Se incluye la ampliación de uso: arroz (ver cuadro de usos) -Se incluye la información de arroz para el item: Volumen de agua. -Se actualiza la información de manejo de resistencia.
2025-03-20	Ampliación Formulator	-Se incluyen los formuladores que ya se habían incluido en la versión del 2024-02-21 Corteva Agriscience de Colombia S.A.S. CTVA Proteção de Cultivos Ltda Corteva Agriscience Argetina S.R.L.

Approach™ Power

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición:

Picoxystrobin 90 g/l
Cyproconazole 40 g/l
Aditivos.....c.s.p.1 l

Registro N°: 320-F1/NA

Uso: Fungicida agrícola

Grupo químico:

Picoxystrobin - Estrobilurina (Grupo 11 FRAC)
Cyproconazol - Triazol (Grupo 3 FRAC)

Tipo de Formulación: Emulsión Concentrada (EC)

Nombre Ingrediente Activo: Picoxystrobin 90 g/l y
Cyproconazol 40 g/l

Nombre químico (IUPAC):

Picoxystrobin: methyl (E)-3-methoxy-2-[2-[6-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxymethyl]phenyl]acrylate
Cyproconazol: (2RS,3RS,2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

Fórmula Empírica:


Picoxystrobin: C₁₈ H₁₆ F₃ NO₄
Cyproconazol: C₁₅ H₁₆ Cl N₃ O

Peso Molecular:


Picoxystrobin: 367.32 g/mol
Cyproconazol: 291.78 g/mol

Fórmula Estructural:

Picoxystrobin:



Cyproconazol:



Estado físico: Líquido

Color: Amarillo

Olor: Suave aromático

pH: 6.2

Capacidad de envases: 250 ml, 500 ml, 1 l, 3.5 l, 4 l, 10 l, 20 l, 30 l y 60 l.

Material de envases: HDPE, COEX y PET

TITULAR DEL REGISTRO:

Corteve Agriscience de Ecuador S.A.



Av. 6 de diciembre 2816 y Paúl Rivet. Edificio Josueth Gonzáles. Oficina 10.
Quito, Ecuador.

FORMULADO POR:

Rizobacter Argentina S.A.
Av. Dr. Arturo Frondizi, 1150 - Parque Industrial,
Pergamino. Buenos Aires. B2702HDA. Argentina.

DISTRIBUIDO POR:

Corteve Agriscience de Colombia S.A.S.
Manmonal, Km 14, Cartagena Apartado
2888 Colombia

CTVA Proteção de Cultivos Ltda
Rod. Presidente Tancredo de Almeida Neves, Km
38. Franco de Rocha-SP, 07809-105 Brazil

Corteve Agriscience Argentina S.R.L.
Avda. Hipólito Irigoyen N° 2900- (S2202DRA)
Pto Gral San Martín
Provincia de Santa Fe

™ Marcas registradas de Corteve Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteve.

Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo si se inhala.

Muy tóxico para
organismos acuáticos



PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Approach™ Power es un fungicida de amplio espectro para el control foliar de enfermedades. Tiene actividad sistémica, traslaminar y protectora de larga duración. Approach™ Power se debe aplicar dentro de un programa de protección de cultivos en rotación con otros fungicidas. Approach™ Power a través de sus activos Picoxystrobin y Cyproconazole, actúa como inhibidor de la quinona interna, interviniendo en proceso de germinación de esporas y pérdida de integridad de la pared celular del hongo a controlar. penetra rápidamente en la planta, reduciendo pérdidas de lavado por lluvias a partir de una hora después de realizada la aplicación.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Picoxystrobin, Acción preventiva y curativa. Inhibidor de la respiración (fungicida QoL). **Cyproconazol**, Sistémico con acción protectora, curativa y erradicante. Interrumpe la función de la membrana. Un inhibidor de la biosíntesis de ergosterol.

El uso de este producto se debe apoyar en las estrategias de manejo de resistencia, tales como prácticas culturales y biológicas de control y la rotación de grupos de fungicidas con diferentes modos de acción en las aplicaciones, enfocadas en el estado más susceptible de la plaga.

MODO DE EMPLEO:

Disolver completamente la cantidad de **Approach™ Power** a ser usada en un balde, luego depositarla en el tanque de mezcla que contenga agua hasta ¾ a la mitad de su capacidad. Completar el volumen total de agua y agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

EQUIPOS DE APLICACIÓN:

Aspersión foliar, asegurando cobertura del área total foliar del cultivo.

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plaga	Dosis (l/ha)	PC (días)
Maíz (Zea mays)	Mancha de asfalto (Phyllachora maydis)	1.0	30
Arroz (Oriza sativa)	Mancha naranja Gaeumennomyces sp	0.8	42

PC: Período de carencia

VOLUMEN DE AGUA: se recomienda utilizar 400 l/ha. **Arroz** se recomienda utilizar 300 l/ha

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar la aplicación en un estado de desarrollo V6-V8 con inicios de síntomas de mancha de asfalto.

Arroz: realizar una aplicación en crecimiento vegetativo a partir de los 30 días después de la siembra

Manejo de resistencia: Approach™ Power contiene el ingrediente activo Picoxystrobin (CÓDIGO FRAC 11) y Cyproconazol (CÓDIGO FRAC 3). No se recomienda usar únicamente Approach™ Power u otros fungicidas de los CÓDIGOS 11 y 3 para controlar la misma enfermedad durante toda la temporada. Se recomienda rotar y/o mezclar con productos que tengan diferentes mecanismos de acción (MoA) o limitar el número total de aplicaciones por temporada. No modifique la dosis recomendada en etiqueta, ni lo use fuera del momento recomendado. Se alienta el manejo responsable de la resistencia para garantizar un control efectivo a largo plazo de las enfermedades fúngicas. Approach™ Power no debe alternarse o ser mezclado con cualquier fungicida al que ya se haya desarrollado resistencia.

REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

FITOTOXICIDAD: Si se utiliza este producto siguiendo las recomendaciones de dosis y manejo que se incluyen en esta etiqueta, no se espera efectos adversos o fitotóxicos.

COMPATIBILIDAD: Approach™ Power es compatible con muchos fungicidas comúnmente utilizados lo mismo que con fertilizantes químicos, herbicidas, insecticidas y productos de control biológico de uso común. Sin embargo, dado que las formulaciones de los productos siempre están cambiando, es aconsejable probar la compatibilidad física de las mezclas deseadas, con el fin de poder detectar efectos adversos como la sedimentación o floculación. Para determinar la compatibilidad física, se recomienda hacer una pre-mezcla con las dosis equivalentes de la etiqueta de los productos a mezclar, agitar bien y dejar reposar durante 20 minutos. Si la combinación se mantiene uniforme o no se separa, o puede volver a mezclarse fácilmente, se considera que la mezcla de tanque es físicamente compatible.

RESPONSABILIDAD:

“El titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORÍA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO



CONTROL REGULATORY		
Fecha de actualización	Concepto	Detalle
2023-12-04	Nuevo registro	-Se crea la HIA para el nuevo registro Aproach Power
2024-02-26	Ampliación uso	-Se incluye la ampliación de uso: arroz (ver cuadro de usos) -Se incluye la información de arroz para el item: Volumen de agua. -Se actualiza la información de manejo de resistencia.
2025-03-20	Ampliación Formulator	-Se incluyen los formuladores que ya se habían incluido en la versión del 2024-02-21 Corteva Agriscience de Colombia S.A.S. CTVA Proteção de Cultivos Ltda Corteva Agriscience Argetina S.R.L.