



INGREDIENTES ACTIVOS

Thiram	345 g/L
Pyrimethanil	215 g/L

Nombre Químico

Thiram

tetramethylthiuram disulfide (IUPAC).

Pyrimethanil

N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline (IUPAC).

No. CAS

Thiram: 137-26-8

Pyrimethanil: 53112-28-0

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada (SC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico:	Líquido
Color:	Beige
Olor:	Aromático
pH:	6
Densidad:	1.06 g/ml
Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento durante dos años.
Inflamabilidad:	No inflamable
Explosividad:	No explosivo

MODO DE ACCIÓN

BOTRILEX®, es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos, con el siguiente modo de acción: Thiram fungicida de contacto con acción protectora. Pyrimethanil fungicida de contacto con actividad curativa, protectora y movilidad translaminar.

MECANISMO DE ACCIÓN

BOTRILEX®, gracias a sus componentes presenta el siguiente mecanismo: Thiram, el cual presenta una reacción química no específica, con grupos tiol en amino ácidos y enzimas, resultando en la disrupción de la respiración y otras funciones celulares. Pyrimethanil, inhibe la síntesis de metionina, resultando en la inhibición de la secreción de las enzimas hidrolíticas necesarias para la degradación de la pared celular de la planta y subsecuentemente la infección del hongo.

RECOMENDACIONES DE USO

BOTRILEX®, se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Agregar el resto de agua y agitar hasta que la mezcla sea homogénea. El producto es aplicado en forma terrestre, utilizándolo mediante aplicación foliar.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (Período de Carencia)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO		
Rosas (<i>Rosa</i> sp)	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	2 L/ha	No aplica
Ají (<i>Capsicum frutescens</i>)	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	2.0 ml/L	
Berenjena (<i>Solanum melongena</i>)				
Naranja (<i>Solanum quitoense</i>)				
Pepino dulce (<i>Solanum muricatum</i>)				
Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)				
Uvilla (<i>Physalis peruviana</i>)				

Volumen de agua: Rosa: 1000 litros/ha. Ají, Berenjena, Naranja, Pepino dulce, Pimiento, Tomate de árbol, Uvilla: 1000 litros/ha.

DIRECCIÓN:

km 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-371-2000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación

COMPATIBILIDAD

BOTRILEX® no es compatible con productos de fuerte reacción alcalina como caldo bordelés, oxiclورو e hidróxido de cobre. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de realizar la aplicación y no mezclarlo con productos que contengan clorothalonil, triforina y amitraz. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar la mezcla final.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el Titular del Registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

CATEGORÍA 4 "LIGERAMENTE TÓXICO"



PRESENTACIÓN

250 ml y 1 L.

REGISTRO

182-F1/NA

TITULAR DE REGISTRO, FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR

INTEROC S.A.

km 16.5. Vía Daule.
Guayaquil - Ecuador

DIRECCIÓN:

km 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-371-2000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación