



INGREDIENTES ACTIVOS

Nombre Común

Mancozeb 640 g/kg

Cymoxanil 80 g/kg

Nombre Químico

Mancozeb
manganese ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric)
(IUPAC)

Cymoxanil

1-(2-cyano-2-methoxyiminoacetyl)-3-ethylurea (IUPAC)

No. CAS

Mancozeb: 8018-01-7

Cymoxanil: 57966-95-7

FORMULACIÓN

Polvo Mojable, WP

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico: Sólido – Polvo fino

Color: Amarillo mostaza

Olor: Característico

pH: 8.13

Densidad: 0.52 g/ml a 20° C

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

CURALANCHA® es un fungicida foliar de acción protectora y curativa, posee actividad sistémica local y por contacto.

MECANISMO DE ACCIÓN

CURALANCHA® inhibe la esporulación de los hongos durante la incubación. Su actividad sistémica mejora su efecto en periodos de alta presión de la enfermedad.

RECOMENDACIONES DE USO

CURALANCHA® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar. Se recomienda realizar tres aplicaciones por ciclo, con un intervalo de 7 a 14 días entre aplicación; dependiendo de las condiciones climáticas y la presencia de la plaga en el cultivo.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger.

Ponga en el tanque de mezcla la mitad del agua que se vaya a emplear, adicione la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agite. Adicione el resto de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. El producto es aplicado en forma terrestre.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (Período de Carenza)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO		
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.0 kg/ha	14 Días
Ají (<i>Capsicum frutescens</i>) Berenjena (<i>Solanum melongena</i>) Naranjilla (<i>Solanum quitoense</i>) Pepino dulce (<i>Solanum muricatum</i>) Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>) Tomate de árbol (<i>Cyphomandra betacea</i>) Uvilla (<i>Physalis peruviana</i>)	Lancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.5 kg/ha	7 Días
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Lancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.5 g/L	30 Días
Alcachofa (<i>Cynara scolymus</i>) Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>) Stevia (<i>Stevia rebaudiana</i>)	Mildiú velloso	<i>Bremia lactucae</i>	2.5 g/L	21 Días

Volumen de agua para Tomate riñón: 1000 L/ha.

Volumen de agua para Alcachofa, Lechuga y Stevia: 400 L/ha.

DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

WEB:

Interoc@interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER



COMPATIBILIDAD

El producto es compatible con el Benomil, Carbendazim, Metomil y Oxamil, así como con los plaguicidas que son compatibles con Mancozeb. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

CATEGORÍA 4 “LIGERAMENTE PELIGROSO”



PRESENTACIONES

250 g, 500 g, 1 kg.

REGISTRO

058-F12/NA

FORMULADOR

GUANGDONG KEYWA CHEMICAL TRADING CENTER CO. LTD. / NINGBO GENERIC CHEMICAL CO. LTD. / INTEROC S.A. / INDOFIL INDUSTRIES LIMITED / SINO-AGRI RED SUN BIO-TECHNOLOGY CO. LTD. / LIMIN CHEMICAL CO. LTD. / SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO. LTD

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

INTEROC S.A.
km 16.5 Vía Daule
Guayaquil-Ecuador

DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

WEB:

Interoc@interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER