



## INGREDIENTE ACTIVO

### Nombre Común

Chlorothalonil 500 g/L  
Dimethomorph 250 g/L

### Nombre Químico

Chlorothalonil: tetrachloroisophthalonitrile  
Dimethomorph: (EZ)-4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

### No. CAS

Chlorothalonil: 1897-45-6  
Dimethomorph: 110488-70-5

## FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada, SC

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**Estado físico:** Líquido  
**Color:** Beige  
**Olor:** Leve  
**pH:** 6  
**Densidad:** 1.3071 g/ml  
**Estabilidad:** Estable bajo condiciones normales de almacenamiento  
**Inflamabilidad:** No inflamable  
**Explosividad:** No explosivo

## MODO DE ACCIÓN

**DIACONO®** es un fungicida formulado a base de dos ingredientes activos:  
Chlorothalonil posee acción de contacto no sistémico y Dimethomorph actúa de manera sistémica, translaminar y antiesporulante

## MECANISMO DE ACCIÓN

**DIACONO®** está formado por dos ingredientes activos:  
Chlorothalonil: es un inhibidor multisitio que afecta varias enzimas y otros procesos metabólicos del hongo.  
Dimethomorph: inhibe la formación de la pared celular desencadenando la muerte del hongo..

## RECOMENDACIONES DE USO

**DIACONO®** se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

Aplicar en cuanto se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la misma, se recomienda hacer una segunda aplicación con intervalo de 7 días.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretenda proteger. Colocar la mitad del agua en el tanque de mezcla, adicionar la cantidad recomendada de **DIACONO®** y agite. Adicionar el resto de agua. **DIACONO®** debe ser aplicado foliarmente evitando su aplicación cuando se pronostique lluvia

## USOS Y DOSIS

| CULTIVO                                                                            | PLAGA                |                               | DOSIS    | PC (Período de Carencia) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|--------------------------|
|                                                                                    | N. COMÚN             | N. CIENTÍFICO                 |          |                          |
| Papa<br>( <i>Solanum tuberosum</i> )                                               | Lancha, tizón o gota | <i>Phytophthora infestans</i> | 0.6 L/ha | 7 Días                   |
| Brócoli<br>( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cymosa</i> ) | Midiú                | <i>Peronospora parasitica</i> | 1 ml/L   | 7 Días                   |
| Col arrepollada<br>( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> )               | Midiú                | <i>Peronospora parasitica</i> | 1 ml/L   | 7 Días                   |
| Col china<br>( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>pekinensis</i> )                   | Midiú                | <i>Peronospora parasitica</i> | 1 ml/L   | 7 Días                   |
| Col de brúselas<br>( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> )              | Midiú                | <i>Peronospora parasitica</i> | 1 ml/L   | 7 Días                   |
| Coliflor<br>( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> )                      | Midiú                | <i>Peronospora parasitica</i> | 1 ml/L   | 7 Días                   |
| Nabo<br>( <i>Brassica napus</i> )                                                  | Midiú                | <i>Peronospora parasitica</i> | 1 ml/L   | 7 Días                   |

### DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule  
Guayaquil, Ecuador

### TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

### WEB:

[www.interoc.biz](http://www.interoc.biz)



Pasión por la innovación

|                                           |       |                                   |        |        |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|--------|
| Rábano<br>( <i>Raphanus<br/>sativus</i> ) | Midiú | <i>Peronospora<br/>parasitica</i> | 1 ml/L | 7 Días |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|--------|

**Volumen de agua:** Papa: 600 litros/ha. **Brócoli:** 600 litros/ha.  
**Col arrepollada:** 600 litros/ha. **Col china:** 600 litros/ha. **Col de  
bruselas:** 600 litros/ha. **Coliflor:** 600 litros/ha. **Nabo:** 600  
litros/ha. **Rábano:** 600 litros/ha.

#### COMPATIBILIDAD

**DIACONO®** no presenta reacciones de incompatibilidad con plaguicidas comunes, excepto aquellos de fuerte reacción alcalina, sulfatos, caldos cúpricos, azufre, diazinon, dodine y amitraz. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar la aplicación.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el Titular del Registro o con el distribuidor del producto”.

#### CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

##### CATEGORÍA 4 “LIGERAMENTE PELIGROSO”



#### PRESENTACIONES

200 ml, 1 L y 200 L

#### REGISTRO

145-F2/NA

#### FORMULADO POR

Jiangsu United Agrochemical Co. Ltd.; Interoc S.A.

#### TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

**INTEROC S.A.**  
km 16.5 Vía Daule  
Guayaquil-Ecuador

#### DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule  
Guayaquil, Ecuador

#### TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

#### WEB:

[www.interoc.biz](http://www.interoc.biz)



*Pasión por la innovación*