



INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Furalaxyl-M 125 g/l

Nombre Químico

Methyl N-(2-furoyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate

No. CAS

57764-08-6

FORMULACIÓN

Concentrado Emulsionable (EC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico:	Líquido
Color:	Amarillo ámbar
Olor:	Sin olor
pH:	5 aprox. (1% agua destilada)
Densidad:	0.995 g/ml
Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.
Inflamabilidad:	No inflamable
Explosividad:	No explosivo

MODO DE ACCIÓN

Fungicida de acción sistémica, utilizado en cultivos ornamentales, especialmente en rosas para el control de enfermedades causadas por hongos del orden Oomicetos como mildew veloso y podredumbres.

Fungicida con acción protectora y curativa y prolongado período de residualidad. Es absorbido por raíces, hojas y tallos y penetra rápidamente en la planta. Detiene el desarrollo de los hongos interfiriendo con la síntesis de proteínas.

MECANISMO DE ACCIÓN

FRILEX es traslocado acropetalmente a través del xilema de las plantas. Detiene el desarrollo de los hongos interfiriendo con la síntesis de proteínas, inhibiendo la síntesis del ácido ribonucleico. **FRILEX** impide el crecimiento subcuticular de las hifas del patógeno en los tejidos afectados de la planta, por lo que su acción primordial se califica como curativa y erradicante.

RECOMENDACIONES DE USO

Las aplicaciones de **FRILEX** pueden ser curativas o preventivas cuando las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la enfermedad. Se recomienda rotar el uso con fungicidas de diferente modo de acción para prevenir el desarrollo de resistencia.

MODO DE APLICACIÓN

Agítese el envase antes de dosificar. Diluya la cantidad recomendada en un recipiente aparte en un poco de agua hasta

obtener una mezcla homogénea. Agregue la premezcla en la cantidad de agua a emplear de acuerdo a la superficie que pretende controlar, agitando constantemente, úselo inmediatamente, no guardar.

Utilice equipo de protección durante la manipulación y aplicación.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (Período de carencia)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO		
Rosas (<i>Rosa</i> sp.)	Mildiú veloso	<i>Peronospora sparsa</i>	2 ml/L	No aplica
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Lancha	<i>Phytophthora infestans</i>	0.60 L/ha	14 Días

Volumen de agua: Rosas: 2000 litros/ha. Papa: 800 litros/ha

COMPATIBILIDAD

FRILEX puede ser aplicado en mezcla con otros productos fitosanitarios. Se recomienda hacer prueba de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

AVISO AL COMPRADOR

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: III LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

PRESENTACIONES

100 ml, 1 L

REGISTRO

016- F2/NA

FORMULADORES

Jiangsu Baoling Chemical Co. Ltd., Interoc S.A., Agrofina S.A.

TITULAR DEL REGISTRO Y DISTRIBUIDOR

INTEROC S.A.

DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación

km 16.5 Vía Daule
Guayaquil-Ecuador

DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación