INVICTO

INGREDIENTES ACTIVOS

Acephate	450 g/kg
Imidacloprid	250 g/kg

Nombre Químico
Acephate:
(RS) - N-[methoxy (methylthio) phosphinoyl] acetamide.
Imidacloprid:
(E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine.

No. CAS
Acephate: 30560-19-1
Imidacloprid. 138261-41-3

FORMULACIÓN

Polvo Mojable, WP

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico: Polvo
Color: Blanco
Olor: Característico
pH: 5.7
Densidad: 0.463 g/ml a 20°C
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

INVICTO® es un insecticida formulado a base de dos ingredientes activos absolutamente complementarios que le confieren al producto una alta capacidad sistémica, de contacto e ingestión, **INVICTO®** es tomado por las raíces y absorbido a través de las hojas en la planta.

MECANISMO DE ACCIÓN

INVICTO® está formado por dos ingredientes activos: Acephate inhibe la acción de la acetilcolinesterasa, y actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos provocándoles la muerte. Imidacloprid que afecta las funciones normales del SNC de los insectos, mediante la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, dando como resultado el bloqueo de las señales de los nervios, parálisis y posteriormente la muerte del insecto.

RECOMENDACIONES DE USO

INVICTO® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Disuelva completamente la cantidad recomendada de **INVICTO®** en un balde y luego deposítelo en un tanque de mezcla que contenga agua hasta un cuarto o la mitad de la capacidad, complete el volumen de agua hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla de vez en cuando y cada vez que vaya a llenar el equipo d aplicación

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (Período de Carencia)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO		
Tabaco (*Nicotiana tabacum*)	Mosca blanca	*Bemisia tabaci*	750 g/ha	3 Días
Arroz (*Oryza sativa*)	Mosca minadora	*Hydrellia sp.*	250 g/ha	3 Días
Rosas (*Rosa* sp.)	Trips	*Frankliniella occidentalis*	0.5 g/litro de agua	No Aplica
Tomate riñón (*Lycopersicon esculentum*)	Mosca blanco	*Trialeurodes vaporariorum*	0.375 g/L	7 Días
Papa (*Solanum tuberosum*)	Pulguilla	*Epitrix similaris*	1.125 g/L	30 Días
	Paratrioza	*Bactericera cockerelli*	0.75 kg/ha	
Pimiento (*Capsicum annuum*)	Paratrioza	*Bactericera cockerelli*	0.75 kg/ha	7 Días
Tomate cherry (*Solanum lycopersicum var. cerasiforme*)	Paratrioza	*Bactericera cockerelli*	0.75 kg/ha	7 Días
Tomate de árbol (*Solanum betaceum*)	Paratrioza	*Bactericera cockerelli*	0.75 kg/ha	30 Días
Uvilla (*Physalis peruviana*)	Paratrioza	*Bactericera cockerelli*	0.75 kg/ha	30 Días
Ají (*Physalis peruviana*)	Paratrioza	*Bactericera cockerelli*	0.75 kg/ha	7 Días
Naranjilla (*Solanum quitoense*)	Paratrioza	*Bactericera cockerelli*	0.75 kg/ha	30 Días
Pepino dulce (*Solanum muricatum*)	Paratrioza	*Bactericera cockerelli*	0.75 kg/ha	30 Días
Berenjena (*Solanum melongena*)	Paratrioza	*Bactericera cockerelli*	0.75 kg/ha	30 Días

DIRECCIÓN:
km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:
(593) 4-3-712-000

WEB:
www.interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación

Volumen de agua: tabaco: 400 litros/ha. **arroz:** 200 litros/ha. **Rosas:** 1000 litros/ha. **Tomate riñón:** 1000 litros/ha. **Papa (control de pulguilla):** 400 litros/ha. **Papa (control de paratrioza):** 600 litros/ha. **Pimiento, tomate cherry, tomate de árbol, uvilla, ají, naranjilla, pepino dulce y berenjena:** 600 litros/ha.

COMPATIBILIDAD

INVICTO® no presenta reacciones de incompatibilidad con plaguicidas comunes, excepto aquellos de fuerte reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el Titular de Registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

CATEGORÍA 4 "LIGERAMENTE PELIGROSO"

PRESENTACIONES

125 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg.

REGISTRO

130-I1/NA

FORMULADO POR

Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd./ Meghmani Organics Limited/ Anhui Fengle Agrochemical Co. Ltd/ Agrow Allied Ventures Pvt. Ltd. Lion Agrevo(Jiangsu) Co. Ltd.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

INTEROC S.A.
km 16.5 Vía Daule
Guayaquil-Ecuador

DIRECCIÓN:
km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:
(593) 4-3-712-000

WEB:
www.interoc.biz

INTEROC
Pasión por la innovación