



INGREDIENTES ACTIVOS

Diethofencarb 350 g/L

Nombre Químico

Diethofencarb: Isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate (IUPAC)

No. CAS

Diethofencarb: 87130-20-9

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada, SC

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido
Color: Blanco a gris
Olor: Sin olor
pH: 7.35
Densidad: 1.05 g/ml a 20°C
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

KORUS® es un fungicida sistémico con acción protectante y curativa. Fácilmente absorbido a través de hojas y raíces y translocado a toda la planta.

MECANISMO DE ACCIÓN

KORUS® inhibe la mitosis mediante la unión a beta-tubulin en los tubos germinales de moho gris.

RECOMENDACIONES DE USO

Las aplicaciones aéreas de **KORUS®** se deben realizar siempre en ausencia de precipitaciones o brisas fuertes; recomendable en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, evitando las altas temperaturas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KORUS® puede ser usado en emulsión y suspensión, solo en mezcla, con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción que no presenten resistencia cruzada.

Preparación de emulsiones: verter el volumen de aceite por hectárea en el tanque de mezcla, iniciar la agitación por 3 minutos, añada la mitad del volumen total de agua a utilizar, agregar la dosis recomendada de **KORUS®**, seguido

completar el volumen con la cantidad necesaria de agua y continuar la agitación de la mezcla por un tiempo mínimo de 5 minutos hasta homogenizar.

Preparación de suspensiones: para aplicaciones solo con aceite, la preparación inicia al verter la cantidad necesaria de aceite en el tanque de mezcla, agregue el emulsificante no iónico al 1% de la dosis de aceite, agite por 3 minutos, agregue la dosis recomendada de **KORUS®** y continúe con la agitación de la mezcla por un tiempo mínimo de 5 minutos hasta homogenizar. Modo de empleo: Las aplicaciones aéreas de **KORUS®** se deben realizar siempre en ausencia de precipitaciones o brisas fuertes; recomendable en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde, evitando las altas temperaturas.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (Periodo de carencia)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO		
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA.)	Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	0.43 L/ha	0 Días
Plátano (<i>Musa paradisiaca</i>)	Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	0.43 L/ha	0 Días

Volumen de agua: **Banano:** 100 litros/ha. **Plátano:** 100 litros/ha.

COMPATIBILIDAD

KORUS® no presenta reacciones de incompatibilidad con plaguicidas comunes, excepto con soluciones ácidas y alcalinas fuertes y agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el Titular del Registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

CATEGORÍA 4 “LIGERAMENTE PELIGROSO”



ATENCIÓN

DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación

PRESENTACIONES

1 L, 5L, 10 L, 200L

REGISTRO

221-F1/NA

FORMULADO POR

Interoc S.A., Jiangsu United Agrochemical Co. Ltd.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDO POR

INTEROC S.A.

km 16.5 Vía Daule
Guayaquil-Ecuador

DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación