



Ligustro

INGREDIENTES ACTIVOS

2,4-D Ácido	120 g/L
Picloram Ácido	200 g/L
Fluroxypyr Ácido	80 g/L

Nombre Químico

2,4-D Ácido:
(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid

Picloram Ácido:
4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid

Fluroxypyr Ácido:
4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic acid

No. CAS

2,4-D Ácido:	94-75-7
Picloram Ácido:	1918-02-1
Fluroxypyr Ácido:	69377-81-7

FORMULACIÓN

Microemulsión, ME

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico:	Líquido
Color:	Ámbar
Olor:	Característico
pH:	7.22
Densidad:	1.145 g/ml a 20°C
Estabilidad:	Estable por dos años bajo condiciones normales de almacenamiento
Inflamabilidad:	No inflamable
Explosividad:	No explosivo

MODO DE ACCIÓN

LIGUSTRO® es un herbicida selectivo postemergente con acción sistémica.

MECANISMO DE ACCIÓN

LIGUSTRO® constituido por tres ingredientes activos; 2,4-D ácido que es un herbicida sistémico hormonal auxínico muy común, que actúa como ácido indolilacético inhibiendo el crecimiento de las malezas de hoja ancha; Picloram ácido, actúa como un "imitador de auxina" u hormona de crecimiento sintética que causa un crecimiento descontrolado y desorganizado en plantas susceptibles y Fluroxypyr ácido que imita una hormona de crecimiento vegetal (similar al ácido indolacético) que da como resultado un crecimiento celular interrumpido.

RECOMENDACIONES DE USO

LIGUSTRO® se debe aplicar foliarmente y de manera uniforme. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie. Llenar el tanque de mezcla con la mitad de agua, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Completar el resto del volumen de agua y continuar agitando hasta homogenizar el caldo de aspersión.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (Periodo de carencia)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO		
Potreros Monocotile-dóneas	Escoba	<i>Sida acuta</i>	2.0 L/ha	30 Días
Potreros	Dormidera	<i>Mimosa pudica</i>	1.0 L/ha	
	Hierba de toro	<i>Cuphea strigulosa</i>		
	Clavo de agua	<i>Ludwigia hyssopifolia</i>		
	Malva	<i>Malva sylvestris</i>		
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Coquito	<i>Cyperus difformis</i>	0.2 L/ha	60 Días
	Barba de indio	<i>Fimbristylis miliacea</i>		
	Clavo de agua	<i>Ludwigia linifolia</i>		
	Botoncillo	<i>Eclipta alba</i>		
	Piñita	<i>Sphenoclea zeylanica</i>		

Volumen de agua: 300 litros/ha

COMPATIBILIDAD

LIGUSTRO® no presenta reacción con los plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el Titular del Registro o con el distribuidor del producto".

DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

WEB:

www.interoc.biz



INTEROC

Pasión por la innovación

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

CATEGORÍA 4 “LIGERAMENTE PELIGROSO”



PRESENTACIONES

1 L, 4 L, 20 L.

REGISTRO

239-H1/NA

TITULAR DEL REGISTRO, FORMULADOR Y DISTRIBUIDO POR

INTEROC S.A.

km 16.5 Vía Daule
Guayaquil-Ecuador

DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación