



INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Copper sulphate pentahydrate 244 g/L

Nombre Químico

Copper Sulfate Pentahydrate: Cobre (2+) sulfate (1:1)

No. CAS

7758-99-8

FORMULACIÓN

Concentrado Soluble, SL

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Verde
Olor: Característico
pH: 3.4
Densidad: 1.24 g/ml
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

NATURAM® es un fungicida y bactericida con acción de contacto/protectante en la superficie de la planta.

MECANISMO DE ACCIÓN

NATURAM® es pasivamente absorbido por las esporas de los hongos y bacterias mientras crecen. Una vez absorbido, **NATURAM®** desactiva los sistemas enzimáticos de los organismos patógenos.

RECOMENDACIONES DE USO

NATURAM® es más efectivo contra las esporas que establecen micelio y debe ser aplicado antes o en el inicio de la enfermedad. Se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Calcular la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Colocar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, adicionar la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agitar. Agregar el resto de agua y agitar hasta que la mezcla sea homogénea. Para preparar la mezcla en suspensión: agregar aceite agrícola, a continuación, agregar **NATURAM®** y mezcle.

Para preparar mezclas en emulsión: Agregue aceite agrícola, añada el emulsificante, agitar, añadir **NATURAM®** disuelto en la cantidad de agua a utilizar y agitar. No aplicar en horas de calor intenso, ni cuando la posibilidad de lluvia próxima, no se harán aplicaciones durante inversiones de temperatura, las aplicaciones se realizarán cuando la velocidad del viento favorece el depósito del rociado del producto sobre el objetivo (aprox. 5 ó 16 km/h), no se aplicará cuando la velocidad del viento exceda los 24 km/h. para aspersiones con bomba de mochila o bastidor (aguilón), usar únicamente boquillas de rociado medio grueso, mantener una franja de seguridad de no menos de 8 m de fuentes de agua.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (Período de Carenia)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO		
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	0.6 L/ha	1 Día
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cymosa</i>)	Alternaria	<i>Alternaria brassicae</i>	1 L/ha	3 Días
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Bacteriosis	<i>Pseudomonas solanacearum</i>	1 ml/L	10 Días
Mango (<i>Mangifera indica</i>)	Bacteriosis	<i>Erwinia</i> sp.	0.6 L/ha	0 Días
Cacao (<i>Theobroma cacao</i> L.)	Moniliasis	<i>Moniliophthora roreri</i>	0.6 L/ha	0 Días

Volumen de agua: Banano: 20 litros/ha. Brócoli: 600 litros/ha. Tomate riñón: 1000 litros/ha. Mango y cacao: 300 litros/ha.

COMPATIBILIDAD

NATURAM® es miscible con todos los plaguicidas a excepción de aceites minerales, es posible mezclarlos utilizando emulsificantes. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para fines aquí

DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación

recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el Titular del Registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

CATEGORÍA 4 “LIGERAMENTE PELIGROSO”



PRESENTACIONES

250 ml, 1 L, 10 L, 19 L y 200 L

REGISTRO

69-F9/NA

FORMULADO POR

Sicit 2000 S.P.A.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

INTEROC S.A.

km 16.5 Vía Daule
Guayaquil-Ecuador

DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación