



COMPOSICIÓN

Nitrógeno total	9.79% p/v
Nitrógeno amoniacal	0.81% p/v
Nitrógeno orgánico	8.98% p/v
Aminoácidos totales	56.4% p/v
Aminoácidos libres	12.3% p/v
Materia orgánica	58.3% p/v

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada, SC

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico:	Líquido en suspensión
Color:	Marrón
Densidad:	1.27 g/ml
pH:	6.2 en solución al 10%

MODO DE ACCIÓN

SIAPTON® es un concentrado de aminoácidos obtenido por hidrólisis enzimática y proteínica.

MECANISMO DE ACCIÓN

La composición de **SIAPTON®** facilita su acción bioestimulante como quelante, facilitando a la planta la asimilación de cantidades adicionales de nutrientes, cuando están siendo expuestas a condiciones externas desfavorables como bajas temperaturas, vientos fríos, suelos empobrecidos, intoxicaciones por agroquímicos.

RECOMENDACIONES DE USO

Calibre el equipo antes de hacer la aplicación para conseguir una distribución uniforme de las dosis recomendadas. Las soluciones de **SIAPTON®** deben ser almacenadas en recipientes de fibra de vidrio o plástico. Lluvias fuertes que ocurren dentro de las 6 horas siguientes a la aplicación reducen su efectividad.

INSTRUCCIONES DE MEZCLA

El bioestimulante **SIAPTON®** es recomendado para todo tipo de cultivo. Las aplicaciones se realizan por vía foliar y por fertirrigación. Se recomienda en cualquier etapa del cultivo, tanto al inicio de la siembra como en desarrollo y floración. En cualquiera de estas etapas su aplicación mejora las condiciones de la planta. mezclar lentamente y completar el resto de agua.

USOS Y DOSIS

CATEGORIZACIÓN ESPECÍFICA	DOSIS L/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Flores	2	Con frecuencia de 15 a 20 días	Edáfico (Aplicado al suelo)
Hortalizas*	1,0-1,5	Al trasplante, en desarrollo vegetativo y en floración.	Foliar
Tubérculos	1,0-1,5	Al aporque, en floración y en formación.	
Cereales	1	Al macollamiento, a la diferenciación del primer primordio foliar y al espigamiento.	
Pastos	3 ml/L	Aplicar 10 días después del pastoreo.	
Frutales**	1,0-1,5	Al trasplante, en desarrollo vegetativo y en floración.	

*Incluye hortalizas de exportación como: brócoli, coliflor y romanesco.

**Incluye frutales de exportación como: pitahaya, tomate de árbol, mango, piña, papaya, cacao y café.

INCOMPATIBILIDAD

SIAPTON® es compatible con fertilizantes líquidos y quelatados aplicados de manera regular. **SIAPTON®** es compatible con la mayoría de agroquímicos utilizados con excepción de: aceites minerales y productos a base de azufre. No se recomienda aplicar **SIAPTON** con productos a base de cobre en temperaturas de extremo calor o durante la floración. Si es aplicado en mezcla con otros agroquímicos o fertilizantes, es aconsejable tratar un área pequeña antes de aplicar a extensiones de cultivos más grandes. No aplicar en ciruelas.

PRESENTACIONES

500 ml, 1 L, 200 L

REGISTRO

2544-F-AGR

FORMULADOR

ISAGRO S.p.A.
Milano - Italia

DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER



TITULAR DEL REGISTRO

SAIBAI

Parroquia Tumbaco, El Quinde N10-61 y Río Amazonas
Quito - Ecuador

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

INTEROC S.A.

km 16.5 Vía Daule
Guayaquil-Ecuador

DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3-712-000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER