



INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Pyrimethanil 600 g/L

Nombre Químico

Pyrimethanil
N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il) anilina (IUPAC)

No. CAS

Pyrimethanil: 53112-28-0

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada, SC

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido
Color: Blanco
Olor: Característico
Densidad: 1.0876 g/ml a 20°C
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

SIGANIL® es un fungicida sistémico translaminar de acción protectante y curativa para el control de Sigatoka negra.

MECANISMO DE ACCIÓN

SIGANIL® actúa inhibiendo la secreción de enzimas requeridas para el proceso de infección, además inhibe la extensión del tubo germinativo y el crecimiento micelio, impidiendo así las posibilidades de infección.

RECOMENDACIONES DE USO

SIGANIL® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados. Aplicar **SIGANIL®** solo en mezcla con otros fungicidas de otro modo de acción que no presenten resistencia cruzada.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Previo a la aplicación se deben calibrar los equipos para obtener una cobertura homogénea de la mezcla incluida el fungicida. Aplicaciones aéreas o con bomba a motor. Vierta la cantidad de aceite agrícola necesaria en el tanque de la mezcladora con el tanque de mezcla y agite.

Agregue el emulsificante a la dosis previamente validada según los productos que desee mezclar y agite por cinco minutos.

Sobre la mezcla añada **SIGANIL®** a la dosis de 0.5 L/ha y agite durante 15 minutos. Complete con agua hasta obtener el volumen total de mezcla, y agite de 10 a 15 minutos, agregar el volumen de agua requerido, incluyendo lo del triple lavado del envase de **SIGANIL®** y agitar por 10 minutos más. Considere para la aplicación aérea un volumen total de descarga de 15 a 23 litros de mezcla/ha y de 60 a 80 litros de mezcla/ha para la aplicación terrestre.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (Período de Carencia)
	N. COMÚN	N. CIENTÍFICO		
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra	<i>Mycosphaerella fijiensis</i>	0.5 L/ha	0 Días

Volumen de agua: 19 litros/ha.

COMPATIBILIDAD

Evite productos de fuerte reacción alcalina como sulfatos, oxicloruros, e hidróxidos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar la aplicación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el Titular del Registro o con el distribuidor del producto".

DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3712-000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

CATEGORÍA 4 "LIGERAMENTE PELIGROSO"



PRESENTACIONES

1 L, 10 L, 200 L

REGISTRO

83-F5/NA

FORMULADO POR

Jiangsu United Agrochemical Co., Ltd. /
Interoc S.A.

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

INTEROC S.A.

km 16.5 Vía Daule
Guayaquil-Ecuador

DIRECCIÓN:

km. 16.5 Vía Daule
Guayaquil, Ecuador

TELÉFONOS:

(593) 4-3712-000

WEB:

www.interoc.biz



Pasión por la innovación